

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства охорони здоров'я України

11.10.07 № 632

Реєстраційне посвідчення

№ UA/2515/01/01

КАЛЬЦИУМ-Д

Сироп

ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛЯ ПАЦІЄНТА

Прочитайте уважно цей листок-вкладыш перед тим, як розпочати застосування препарату!

Зберігайте цей листок-вкладыш. Вам може знадобитися перечитати його.

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся з Вашим лікарем.

Цей препарат призначений особисто Вам, і не слід передавати його іншим особам. Це може завдати їхньому здоров'ю шкоди, навіть якщо симптоми їх захворювання подібні до тих, які спостерігаються у Вас.

СКЛАД ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ:

діючі речовини:

кальцію карбонат, вітамін D3;

5 мл сиропу містять кальцію карбонату 625 мг (еквівалентно елементарному кальцію 250 мг), холекальциферолу 125 МО (еквівалентно вітаміну D3 262,5 МО);

допоміжні речовини:

натрію кармелоза, сорбітол рідкий, натрію метилгідроксибензоат, натрію пропілгідроксибензоат, натрію цитрат, кислоти лимонної моногідрат, динатрію едетат, кремнію діоксид колоїдний безводний, натрію сахарин, барвник еритрозин супра, есенція полунична S-3397, вода очищена.

ЛІКАРСЬКА ФОРМА.

Сироп.

Фармакотерапевтична група.

Комбінація вітаміну D3 з карбонатом кальцію.

Фармакологічні властивості.

Комбінований препарат, який регулює обмін кальцію та фосфору. Поповнює нестачу кальцію та вітаміну D3 в організмі.

Кальцій є найпоширенішим мінералом в організмі людини. Він бере участь у формуванні кісткової тканини, мінералізації зубів, регулюванні процесів нервової провідності та м'язових скорочень, підтримуванні стабільності нервової діяльності.

Холекальциферол (вітамін D3) регулює обмін кальцію та фосфору в організмі. Він посилює всмоктування кальцію у нирках, регулює мінеральний обмін в організмі, що необхідно для нормального дозрівання кісткової тканини, обміну речовини і діяльності фізіологічних функцій.

ПОКАЗАННЯ.

Препарат призначають дорослим і дітям старше 1 місяця з метою профілактики та лікування при дефіциті кальцію та вітаміну D3, що зумовлений неповноцінною дієтою та/або порушенням харчування; для профілактики остеопорозу та як доповнення до специфічної терапії остеопорозу; при підвищеній потребі організму в кальції та вітаміні D3 в період вагітності та годування груддю.

ПРОТИПОКАЗАННЯ.

Підвищена чутливість (алергія) до будь-якого компонента препарату, висока концентрація кальцію в крові, посилене виведення кальцію з організму із сечею або сечокам'яна хвороба, пухлини, такі як міелома, кісткові метастази, саркоїдоз, що призводять до виведення кальцію з кісток. Препарат також протипоказаний при підвищеній активності паразитовидних залоз і при нирковій недостатності. Остеопороз, зумовлений нерухомістю, наприклад при переломах. Передозування вітаміну D3.

ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ.

Вагітність і період годування груддю.

Потреба в кальції та вітаміні D3

підвищується у період вагітності та годування груддю. Застосування сиропу Кальциум-Д показано у період вагітності та годування груддю, але його не можна приймати одночасно з препаратами заліза. Потрібне також враховувати додаткове надходження кальцію та вітаміну D3 з інших джерел. Кальцій проникає в грудне молоко, але його вміст збільшується не настільки, щоб негативно впливати на дитину. Пацієнтам з м'якою та помірною нирковою недостатністю (виявляється у людей похилого віку) або при незначному підвищенні виведення кальцію із сечею необхідно проводити періодичний контроль рівня кальцію у крові. Крім цього необхідно проводити контроль виділення кальцію із сечею пацієнтам, які мають діагноз сечокам'яної хвороби, для запобігання виведенню кальцію з організму.

ВЗАЄМОДІЯ З ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ.

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікаря!

Неконтрольоване лікування може зашкодити Вашому здоров'ю. Кальциум-Д може збільшувати всмоктування препаратів заліза, фторвмісних препаратів та антибіотиків групи тетрациклінів. Одночасне застосування із серцевими глікозидами може підсилювати дію останніх. Одночасне застосування з антибіотиками хінолонового ряду може знижувати всмоктування кальцію. Тому препарат слід приймати за 3 год до або після прийому вищезазначених препаратів. У пацієнтів, які приймають діуретики тіазидного ряду, зрідка можливо підвищення вмісту кальцію в крові.

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.

Дози і тривалість прийому визначає лікар! Суворо дотримуйтесь наданих Вам рекомендацій!

Як профілактичний засіб приймається внутрішньо, безпосередньо перед прийомом їжі або під час їди. Упаковка містить мірну ложечку з поділками, одна поділка відповідає 2,5 мл.

Як профілактичний засіб для профілактики дефіциту кальцію та вітаміну D3 при неповноцінній дієті або порушенні харчування, а також для профілактики остеопорозу та остеомаляції:

- дорослим і дітям старше 6 років по 2,5 мл один раз на добу;
- дітям від 6 місяців до 6 років - по 7,5 мл на добу, розділених на 3 прийоми;
- грудним доношеним дітям від 1 до 6 місяців - по 7,5 мл на добу, розділених на 3 прийоми, попередньо розбавлених молоком або перевареною водою. Вагітним і жінкам, які годують груддю, для профілактики остеопорозу по 5 мл 2 рази на добу.

В умовах підвищеної інсоляції вищевказану дозу зменшують удвічі. Тривалість застосування Кальциум-Д визначається індивідуально лікарем, виходячи з клінічної ситуації та добових доз препарату. Як правило, курс лікування становить два місяці.

ПЕРЕДОЗУВАННЯ.

При передозуванні препарату можливо виникнення нудоти, блювання, зниження апетиту, головного болю, запаморочення, слабкості.

У разі передозування необхідно прийняти велику кількість рідини і терміново звернутися за кваліфікованою медичною допомогою. Симптоматична терапія.

ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ.

Препарат звичайно добре переноситься. Іноді можуть виникати нудота, блювання, закріп, діарея, метеоризм.

При виникненні вищеперелічених або будь-яких незвичних реакцій необхідно негайно звернутися до лікаря.

ТЕРМІН ПРИДАТНОСТІ.

Термін придатності препарату - 2 роки.

Не застосовувати препарат після закінчення терміну придатності, зазначеного на упаковці.

УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.

Зберігати у сухому, захищеному від світла місці, недоступному для дітей, при температурі не вище 25 С

УПАКОВКА.

По 120 мл сиропу у флаконі, по 1 флакону в картонній коробці разом з мірною ложкою.

ПРАВИЛА ВІДПУСКУ.

Без рецепта.

НАЗВА ТА АДРЕСА ВИРОБНИКА.

Індоко Ремедіс Лімітед. В-20.М.І.Д.С., Industrial Area, Waluj Aurangabad 431133,
Maharashtra, India

Автор: Administrator

15.09.09 10:22 - Последнее обновление 04.01.10 13:56

Перший заступник директора Державного фармакологічного центру МОЗ України,
д.мед.н. проф. А. М. Морозов