

**ФЕНОКСИМЕТИЛПЕНИЦИЛЛИН-КМП**  
**Phenoxymethylpenicillin**

Таблетки по 0,25 г

ЛИСТОК-ВКЛАДЫШ. ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПАЦИЕНТА

**УТВЕРЖДЕНО**

Приказ МЗ Украины 17.03.04 № 140

Per. удостоверение № UA/0698/01 /01

Прочитайте внимательно этот листок-вкладыш перед тем, как начать применение препарата!

Храните этот листок-вкладыш. Вам может понадобится перечитать его.

Если у Вас возникнут дополнительные вопросы, пожалуйста, проконсультируйтесь у Вашего врача.

**Состав лекарственного средства:**

***действующее вещество:***

Автор: Administrator

26.08.09 07:29 - Последнее обновление 04.01.10 12:14

---

1 таблетка содержит феноксиметилпенициллина калиевой соли в пересчете на феноксиметилпенициллин 0,25 г;

***вспомогательные вещества:***

гранулак-70, целлюлоза микрокристаллическая, натрия карбоксиметилкрахмал, тальк, кальция стеарат.

**ЛЕКАРСТВЕННАЯ ФОРМА.**

Таблетки.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧЕСКАЯ ГРУППА.**

**Фармакологические свойства.**

Препарат оказывает антибактериальное действие путем подавления процесса деления бактерий, что приводит к их гибели. Феноксиметилпенициллин хорошо и быстро всасывается в пищеварительном тракте.

Лечебные концентрации препарата в крови создаются уже через 30 минут и сохраняются на протяжении 6 - 8 часов.

Проникает через плацентарный барьер и поступает в грудное молоко. Выводится из организма преимущественно с мочой.

## **ПОКАЗАНИЯ.**

Применяют для лечения инфекционных заболеваний, вызванных чувствительными к феноксиметилпенициллину микроорганизмами, в том числе при таких заболеваниях, как обострение хронического бронхита, воспаление легких, ангина и хронический тонзиллит, средний отит, заболевания кожи и мягких тканей (рожистое воспаление, стрептодермия и пиодермия; инфекционные заболевания: гонорея, сифилис, столбняк, сибирская язва). Является одним из основных препаратов для профилактики осложнений при ангинах и хроническом тонзиллите, в частности острой ревматической лихорадки, малой хореи, бактериального эндокардита, гломерулонефрита.

Применяется при дифтерийном носительстве, а также для профилактики бактериального эндокардита после малых хирургических вмешательств (удаление зуба, миндалин).

## **ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ.**

Феноксиметилпенициллин-КМП противопоказан при повышенной чувствительности к пенициллинам, цефалоспорином, карбопенемам, при нарушении всасывания из пищеварительного тракта.

## **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ ПРИ ПРИМЕНЕНИИ.**

Следует с осторожностью применять препарат больным аллергическим диатезом и бронхиальной астмой.

При беременности и в период грудного вскармливания возможен прием Феноксиметилпенициллина-КМП, однако перед началом лечения следует тщательно взвесить ожидаемую пользу его применения для матери и потенциальный риск для плода или ребенка.

При почечной недостаточности необходимо снизить дозу или увеличить интервал между приемами.

У больных с аллергической реакцией на цефалоспориновые антибиотики (цефалексин, цефазолин, цефтриаксон, цефотаксим и др.) может возникать перекрестная аллергия и на Феноксиметилпенициллин-КМП.

## **ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ЛЕКАРСТВЕННЫМИ СРЕДСТВАМИ.**

Если Вы принимаете какие-либо другие лекарственные средства, обязательно сообщите об этом врачу.

Питьевая сода (натрия гидрокарбонат) уменьшает всасывание Феноксиметилпенициллина-КМП в кишечнике.

Совместное применение с рядом других антибактериальных препаратов, такими как сульфадиметоксин, бисептол, котримоксазол, тетрациклин, доксициклин, левомецетин, эритромицин, взаимно снижает эффективность действия этих препаратов.

При одновременном применении Феноксиметилпенициллина-КМП с гормональными противозачаточными препаратами эффективность последних снижается.

Ацетилсалициловая кислота и индометацин замедляют выведение Феноксиметилпенициллина-КМП почками и таким образом удлиняют его действие в организме больного.

## **ОСОБЫЕ УКАЗАНИЯ.**

При длительном приеме Феноксиметилпенициллина-КМП необходимо периодически делать контрольные анализы крови и оценивать функциональное состояние почек.

## **СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ И ДОЗЫ.**

Феноксиметилпенициллин-КМП принимают внутрь натощак, за 30-60 минут до, или через 2 часа после еды. Относительно дозировки для детей необходимо проконсультироваться с врачом.

Автор: Administrator

26.08.09 07:29 - Последнее обновление 04.01.10 12:14

---

Взрослые принимают по 2 - 3 таблетки (0,5 - 0,75 г) 3 - 4 раза в день, максимальная суточная доза - 16 таблеток (4,0 г). Продолжительность лечения - не менее 5 - 7 дней; при инфекциях, вызванных р-гемолитическим стрептококком, - 7- 10 дней. Для профилактики рецидивов ревматической атаки и/или малой хореи принимают по 2 таблетки (0,5 г) 2 раза в сутки.

Относительно дозировки при применении с целью профилактики стрептококковых инфекций и профилактики эндокардита после малых хирургически; вмешательств необходимо посоветоваться с врачом.

## **ПОБОЧНЫЕ ЭФФЕКТЫ.**

Феноксиметилпенициллин-КМП достаточно безопасный препарат, хорошо переносится больными. Но, иногда возможны понос, умеренная тошнота, воспаление языка и десен, головная боль, в ряде случаев кожные проявления аллергии (зуд, высыпания, покраснение). С появлением этих и других нежелательных реакций прекратите применение препарата и немедленно обратитесь к врачу!

Срок годности. 4 года.

Запрещается пользоваться лекарственным средством после указанной на упаковке даты срока годности. Визуальные приметы непригодности препарата: изменение цвета таблеток (в норме-белый).

## **УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ.**

Автор: Administrator

26.08.09 07:29 - Последнее обновление 04.01.10 12:14

---

Хранить в сухом, защищенном от света месте при температуре от 15°С до 25°С.  
Хранить в недоступном для детей месте.

## **УПАКОВКА.**

По 10 таблеток в контурной ячейковой упаковке, 3 контурных ячейковых упаковки в пачке.

## **ПРАВИЛА ОТПУСКА.**

По рецепту. Украина ОАО «Киевмедпрепарат» 01032, г. Киев, ул. Саксаганского, 139  
тел.ф.: (044) 216-31-84; 216-14-74

---

**ФЕНОКСИМЕТИЛПЕНІЦИЛІН-КМП**  
**Phenoxymethylpenicillin**

Автор: Administrator

26.08.09 07:29 - Последнее обновление 04.01.10 12:14

---

Таблетки по 0,25 г

## ЛИСТОК-ВКЛАДИШ. ІНФОРМАЦІЯ ДЛІА ПАЦІЄНТА

### **ЗАТВЕРДЖЕНО**

Наказ МОЗ України 17.03.04 № 140

Реєст. посвідчення UA/0698/01/01

Прочитайте уважно цей листок-вкладыш перед тим, як розпочати застосування препарату!

Зберігайте цей листок-вкладыш. Вам може знадобитися перечитати його.

Якщо у Вас виникнуть додаткові запитання, будь ласка, проконсультуйтеся у Вашого лікаря.

### **Склад лікарського засобу:**

### ***діюча речовина:***

1 таблетка містить феноксиметилпеніциліну калієвої солі в перерахуванні на феноксиметилпеніцилін 0,25 г;

***допоміжні речовини:***

гранулак-70, целюлоза мікрокристалічна, натрію карбоксиметилкрохмаль, тальк, кальцію стеарат.

**ЛІКАРСЬКА ФОРМА.**

Таблетки.

**ФАРМАКОТЕРАПЕВТИЧНА ГРУПА.**

**Фармакологічні властивості.**

Препарат чинить антибактеріальну дію шляхом пригнічення процесу ділення бактерій, що призводить до їх загибелі. Феноксиметилпеніцилін добре і швидко всмоктується у травному тракті.

Лікувальні концентрації препарату в крові створюються вже через 30 хвилин і зберігаються ще протягом 6-8 годин. Проникає крізь плацентарний бар'єр і надходить у грудне молоко. Виводиться із організму переважно з сечею.

## **ПОКАЗАННЯ.**

Застосовують для лікування інфекційних захворювань, що спричиненні чутливими до феноксиметилпеніциліну мікроорганізмами, у тому числі при таких захворюваннях, як загострення хронічного бронхіту, запалення легенів, ангіна і хронічний тонзиліт, скарлатина, середній отит, захворювання шкіри та м'яких тканин (бешиха, стрептодермія, піодермія); інфекційні захворювання: гонорея, сифіліс, правець, сибірка. Є одним з основних препаратів для профілактики ускладнень при ангінах і хронічному тонзиліті, зокрема гострої ревматичної пропасниці, малої хореї, ревматоїдного ендокардиту, гломерулонефриту. Застосовується при дифтерійному носійстві, а також для профілактики бактеріального ендокардиту після малих хірургічних втручань (видалення зуба, мигдаликів).

## **ПРОТИПОКАЗАННЯ.**

Феноксиметилпеніцилін-КМП протипоказаний при підвищеній чутливості до пеніцилінів, цефалоспоринів, карбопенемів, при порушенні всмоктування із травного тракту.

## **ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ.**

Слід з обережністю застосовувати препарат хворим на алергічний діатез і бронхіальну астму. При вагітності та у період грудного вигодовування можна приймати Феноксиметилпеніцилін-КМП, проте перед початком лікування слід ретельно зважити очікувану користь від його застосування для матері та потенціальний ризик для плоду або дитини.

При нирковій недостатності необхідно знизити дозу або збільшити інтервал між прийомами.

У хворих, з алергічною реакцією на цефалоспоринові антибіотики (цефа-лексин, цефазолін, цефтріаксон, цефотаксим та ін.) може виникати перехресна алергія і на Феноксиметилпеніцилін-КМП.

## **ВЗАЄМОДІЯ З ЛІКАРСЬКИМИ ЗАСОБАМИ.**

Якщо Ви приймаєте будь-які інші лікарські засоби, обов'язково повідомте про це лікаря. Питна сода (натрію гідрокарбонат) зменшує всмоктування Феноксиметилпеніциліну-КМП у кишечнику.

Спільне застосування з рядом інших антибактеріальних препаратів, таких як сульфадиметоксин, бісептол, котримоксазол, тетрациклін, доксициклін, левоміцетин, еритроміцин, взаємно знижує ефективність дії цих препаратів.

При одночасному застосуванні Феноксиметилпеніциліну-КМП з гормональними протизаплідними препаратами! ефективність останніх знижується. Ацетилсаліцилова кислота та індометацин уповільнюють виведення Феноксиметилпеніциліну-КМП нирками таким чином подовжують його дію.

## **ОСОБЛИВІ ВКАЗІВКИ.**

При тривалому прийомі Феноксиметилпеніциліну-КМП необхідно періодично робити контрольні аналізи крові та оцінювати функціональний стан нирок.

## **СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ТА ДОЗИ.**

Феноксиметилпеніцилін-КМП приймають внутрішньо натще, за 30-60 хвилин до, або за 2 години після їди. Відносно дозування для дітей необхідно проконсультуватися з лікарем.

Дорослі приймають по 2-3 таблетки (0,5-0,75г) 3-4рази на день, максимальна добова доза -16 таблеток (4,0 г). Тривалість лікування - не менше 5 -7 днів; при інфекціях, що спричинені р-гемолітичним стрептококом, -7-10 днів.

Для профілактики рецидивів ревматичної атаки та/або малої хореї приймають по 2 таблетки (0,5 г) 2 рази на добу.

Відносно дозування при застосуванні з метою профілактики стрептококових інфекцій та профілактики ендокардиту після малих хірургічних втручаннях необхідно проконсультуватися з лікарем.

## **ПОБІЧНІ ЕФЕКТИ.**

Феноксиметилпеніцилін-КМП достатньо безпечний препарат, добре переноситься

Автор: Administrator

26.08.09 07:29 - Последнее обновление 04.01.10 12:14

---

хворими. Проте, інколи можливі: пронос, помірна нудота, запалення язика та ясен, головний біль, у ряді випадків шкірні прояви алергії (свербіж, висипання, почервоніння).

З появою цих та інших небажаних реакцій припиніть застосування препарату негайно зверніться до лікаря!

### **Термін придатності.**

4 роки. Забороняється користуватися лікарським засобом після зазначеної н упаковці дати терміну придатності.

Візуальні прикмети непридатності препарату: зміна кольору таблеток (у нормі-білий).

### **УМОВИ ЗБЕРІГАННЯ.**

Зберігати в сухому, захищеному від світла місці при температурі від 15°С до 25°С.

Зберігати в недоступному для дітей місці.

Автор: Administrator

26.08.09 07:29 - Последнее обновление 04.01.10 12:14

---

## **УПАКОВКА.**

По 10 таблеток у контурній чарунковій упаковці, 3 контурних чарункових упаковки в пачці.

## **ПРАВИЛА ВІДПУСКУ.**

За рецептом. Україна ВАТ «Київмедпрепарат» 01032, м. Київ, вул. Саксаганського,139  
тел.ф.: (044) 216-31-84; 216-14-74